

Derramin® Plus pour-on

USO VETERINARIO
Venta bajo receta

Atención: Lea el rótulo y respete estrictamente las instrucciones.

Fórmula

Cada 100 ml contiene:

Cipermetrina	5,00 g
Clorpirifós.....	2,50 g
Butoxido de Piperonilo	1,00 g
Excipientes, c.s.p.....	100,00 ml

Indicaciones de uso

Antiparasitario externo. Tratamiento y control de la Mosca del cuerno *Haematobia irritans* de los bovinos (vacas, vaquillonas, terneros, novillitos y novillos).

Modo de uso

Administrar DERRAMIN PLUS a la dosis que corresponde, directamente sobre la piel, formando una línea desde delante de la cruz hasta la base de la cola, utilizando el envase dosificador o un dosificador graduado. Algunos componentes de DERRAMIN PLUS ocasionalmente pueden causar una molestia transitoria.

Dosis: Animales de menos de 100 Kg no tratar.
Animales de 100 a 199 kilos 5 ml.
Animales de 200 a 399 kilos 10 ml.
Animales de 400 kilos o más 20 ml.
Dosis máxima 20 ml.

Intervalo entre tratamientos

Mosca del cuerno: Repetir el tratamiento cuando la población de moscas resulte molesta para los animales o alcance un promedio de 200 moscas por animal.

Advertencia

No utilizar en animales con menos de 6 semanas de edad o menos de 100 kilos de peso. No utilizar junto con otros principios activos organofosforados o carbamatos ni dentro de los 30 días desde el último tratamiento. No aplicar sobre animales con el pelo o la piel mojada. No tratar animales enfermos, cansados, débiles o extremadamente flacos, ni en horas de intenso calor. Las lluvias pueden disminuir el poder residual del producto.

El poder residual para el control de mosca de los cuernos es superior al 91% hasta los 14 días post-tratamiento.

Precauciones generales

Peligrosa su ingestión, aspiración y contacto con la piel o los ojos. Guardar cerrado en lugar seguro, fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Evitar la contaminación de alimentos y bebidas. No almacenar o transportar junto con los alimentos. No repetir tratamientos con menos de 30 días de intervalo. Destruir los envases, no guardarlos, inutilizarlos y disponer con residuos rurales, enterrarlos en lugar alejado de cursos de agua. Producto tóxico para abejas y peces. No contaminar estanques o cursos de agua. En caso de sobredosis accidental o intoxicación: Tratar a los animales con Sulfato de atropina al 1 ‰ (1 ml cada 100 kilos) hasta la desaparición de los síntomas. Continuar con tratamiento sintomático y de sostén.

Precauciones durante el uso

Use con cuidado. Utilice ropa que proteja la piel. Cambiarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón al finalizar las tareas. Si cae producto sobre la piel o mucosas, lavar con abundante agua y jabón y cambiarse inmediatamente. No fumar, beber o comer durante el trabajo.

En caso de ingestión, consultar al médico inmediatamente. No provocar el vómito, no dar de beber leche, sustancias grasas o aceites. Si hubo contacto con los ojos: Lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos. Si hay irritación, acudir al médico.

Si hubo contacto con la piel: Quitar la ropa y lavar las partes contaminadas con agua y jabón. En caso de irritación de la piel, dar atención médica.

Advertencia para el médico

El Producto contiene un organofosforado, inhibe la acetilcolinesterasa.

Síntomas: mareos, náuseas, vómitos, diarreas, sudoración, lagrimeo y salivación abundantes, miosis, pulso lento, convulsiones, dificultad respiratoria, coma.

Tratamiento médico

Antídoto: Sulfato de atropina al 1 ‰ (1 por mil). Proceder al lavado gástrico y aspiración.

Administrar vía intravenosa o subcutánea, de 2 a 6 mg de Sulfato de atropina hasta la desaparición de los síntomas (2 mg cada 5 a 10 minutos). Continuar con tratamiento sintomático y de sostén.

Consultas en casos de intoxicaciones: **Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.**

Restricciones de uso: Ganado de leche: entre el último tratamiento y el ordeño para consumo humano o industria, deberán transcurrir 12 horas. Ganado de carne: entre el último tratamiento y el sacrificio para consumo humano, deberán transcurrir 35 días. Las instrucciones de la etiqueta deben ser respetadas.

Brouwer S.A. No se responsabiliza por los daños o perjuicios que pudieran resultar del uso distinto al indicado en el rótulo.

Conservar en su envase original, cerrado, al abrigo de la luz solar directa y a una temperatura entre 15°C y 30° C.

Brouwer S.A. empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua.

■ SENASA

Certificado N°: 15-132

Industria Argentina

Est. Elab. N° 4384

Elaborado por BROUWER S.A.

Dir. Técn.: Dr. Rodolfo A. M. Perotti. Médico Veterinario M.P. N°: 2705

Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. Argentina.

Tel: (54 11) 4555-6663

www.brouwer.com.ar